

**IMPORTANT NOTE:** This is a summary and does not contain all possible information about this product. For complete information about this product or your specific health needs, ask your health care professional. Always seek the advice of your health care professional if you have any questions about this product or your medical condition. This information is not intended as individual medical advice and does not substitute for the knowledge and judgment of your health care professional. This information does not contain any assurances that this product is safe, effective, or appropriate for you.

**WARFARIN - ORAL (WARF-uh-rin)**

**COMMON BRAND NAME(S):** Coumadin

**WARNING:** Warfarin can cause serious, possibly fatal bleeding, which is more likely to occur when patients first start this medication and/or when taking too high of a dose. The risk is greater in patients older than 65 years and in those with major injuries/surgeries, previous stomach/intestinal bleeding, or stroke. Your doctor or other healthcare provider will monitor you closely to decrease your risk. Keep all medical/lab appointments. (See also Precautions section.)

**USES:** This medication is used to treat blood clots and/or to prevent new clots from forming in your body. Preventing harmful blood clots helps to reduce the risk of a stroke or heart attack. Conditions that increase your risk of developing blood clots include a certain type of irregular heart rhythm (atrial fibrillation), heart valve replacement, and recent heart attack. Warfarin is commonly called a "blood thinner," but its more correct term is anticoagulant. It helps to keep blood flowing smoothly in your body by decreasing the amount of certain substances (clotting proteins) in your blood.

**HOW TO USE:** Read the Medication Guide provided by your pharmacist before you start taking warfarin and each time you get a refill. If you have any questions, consult your doctor or pharmacist. Take this medication by mouth with or without food, usually once a day or as directed by your doctor or other healthcare professional. It is very important to take it exactly as prescribed. Do not increase the dose, take it more frequently, or stop using it unless directed by your doctor. Use this medication regularly to get the most benefit from it. To help you remember, take it at the same time each day. Some foods can affect how warfarin works in your blood and may affect your treatment and dose. Cranberry juice or other cranberry products might affect how your warfarin works. Talk with your doctor or pharmacist for more details. (See also Drug Interactions section for other food interactions.) Dosage is based on your medical condition and response to treatment. Your doctor or other healthcare provider will monitor you closely while you are taking this medication. Therefore, laboratory tests will be performed periodically.

**SIDE EFFECTS:** Nausea, loss of appetite, stomach/abdominal bloating, or cramps may occur. If any of these effects persist or worsen, tell your doctor or pharmacist promptly. Remember that your doctor has prescribed this medication because he or she has judged that the benefit to you is greater than the risk of side effects. Many people using this medication do not have serious side effects. This medication can cause serious bleeding if it affects your blood clotting proteins too strongly (unusually high PT and INR lab results). Even if your doctor stops your medication, this risk can continue for up to a week. Tell your doctor immediately if you have any signs of serious bleeding, including: unusual pain/swelling/discomfort, severe headache, dizziness/fainting, unusual or persistent tiredness/weakness, bloody/black/tarry stools, unusual or easy bruising, prolonged bleeding from cuts or gums, persistent/frequent nosebleeds, unusually heavy/prolonged menstrual flow, pink/dark urine, coughing up blood, vomit that is bloody or looks like coffee grounds, fast/pounding heartbeat, chest pain, shortness of breath, difficulty swallowing. This drug may very rarely cause serious, possibly fatal skin/tissue damage. Patients with certain blood conditions (protein C or S deficiency) may be at greater risk. If left untreated, this effect can lead to severe tissue damage (necrosis, gangrene) that requires surgery or amputation. Seek immediate medical attention if any of these very rare but serious side effects occur: painful/red patches, dark discoloration of any body part (e.g., toe, breast, abdomen), painful/tender toes, intense pain/burning feeling (e.g., breast, leg, foot), foot ulcer, back/side/chest pain, change in the amount of urine, muscle/joint pain, vision changes, confusion, slurred speech, weakness on one side of the body. Tell your doctor immediately if any of these unlikely but very serious side effects occur: persistent nausea, vomiting, severe stomach/abdominal pain, yellowing eyes/skin. A very serious allergic reaction to this drug is rare. However, seek immediate medical attention if you notice any symptoms of a serious allergic reaction,

including: rash, itching, swelling, severe dizziness, trouble breathing. This is not a complete list of possible side effects. If you notice other effects not listed above, contact your doctor or pharmacist.

**PRECAUTIONS:** See also Warning section. Before taking warfarin, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies. This medication should not be used if you have certain medical conditions. Before using this medicine, consult your doctor or pharmacist if you have: a bleeding disorder (e.g., hemophilia), recent/current ulcer (e.g., stomach), certain heart diseases (pericarditis, pericardial effusion, bacterial endocarditis), certain brain conditions (cerebrovascular hemorrhage, cerebral aneurysm), recent or planned major surgery/procedure (e.g., brain/eye surgery, lumbar block anesthesia), uncontrolled severe blood pressure (malignant hypertension), certain pregnancy complications (eclampsia, preeclampsia, threatened abortion). Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: alcohol use/abuse, mental/mood disorders (including memory problems), high blood pressure, heart disease (heart failure), high cholesterol/triglycerides, diabetes, kidney disease, liver disease, poor nutrition, stomach/intestinal disease (including absorption problems), vitamin C deficiency (scurvy), swelling of arms/legs (edema), cancer, tumor, radiation therapy, thyroid problems, catheter in your body (e.g., bladder), tissue damage (gangrene, necrosis), recent major injury or surgery, bleeding/blood-clotting problems (e.g., low vitamin K), blood disorders (e.g., anemia, polycythemia), blood vessel disease (e.g., arteriosclerosis, vasculitis), side effect with heparin treatment (heparin-induced thrombocytopenia), family member who did not respond to warfarin treatment. This medication may cause stomach bleeding. Daily use of alcohol while using this medicine will increase your risk for stomach bleeding. Limit or avoid alcoholic beverages. Avoid getting injections into the muscles. If these injections must be given, limit injections to the arms to make it easier to check for bleeding and/or apply pressure bandages. If you have an illness or infection that causes fever, vomiting, or diarrhea for more than 2 days, contact your doctor immediately because these conditions can affect how warfarin works. It is important that all your doctors and dentists know you take warfarin. Before having surgery or any medical/dental procedures, tell your doctor that you are using this medication. This medication can cause heavy bleeding. To lower the chance of getting cut, bruised, or injured, use great caution with sharp objects like safety razors and nail cutters. Use an electric razor when shaving and a soft toothbrush when brushing your teeth. Avoid activities such as contact sports. If you fall or injure yourself, especially if you hit your head, call your doctor immediately. Your doctor may need to check you. The Food & Drug Administration has stated that generic warfarin products are interchangeable. However, consult your doctor or pharmacist before switching warfarin products. Be careful not to take more than one medication that contains warfarin unless specifically directed by the doctor or healthcare provider who is monitoring your warfarin treatment. Caution is advised when using this drug in the elderly because they may be more sensitive to the effects of the drug. This medication is not recommended for use during pregnancy because of serious (possibly fatal) harm to an unborn baby. Discuss reliable forms of birth control with your doctor. If you become pregnant or think you may be pregnant, tell your doctor immediately. If you are planning pregnancy, discuss a plan for managing your condition with your doctor before you become pregnant. Your doctor may switch the type of medication you use during pregnancy. This medication does not pass into breast milk. While there have been no reports of harm to nursing infants, consult your doctor before breast-feeding.

**DRUG INTERACTIONS:** Your doctor or pharmacist may already be aware of any possible drug interactions and may be monitoring you for them. Do not start, stop, or change the dosage of any drug, vitamin, or herbal product without checking with your doctor or pharmacist first. Warfarin interacts with many prescription, nonprescription, vitamin, and herbal products. This includes medications that are applied to the skin or inside the vagina or rectum. The following interactions listed do not contain all possible drug interactions. The interactions with warfarin usually result in an increase or decrease in the "blood-thinning" (anticoagulant) effect. Patients taking warfarin should be closely monitored to prevent serious bleeding or clotting problems. This drug should not be used with the following medication because a very serious interaction may occur: mifepristone. If you are currently taking the medication listed above, tell your doctor or pharmacist before starting warfarin. Aspirin and aspirin-like drugs (salicylates) and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs such as ibuprofen, naproxen, and celecoxib) may have effects similar to warfarin. These drugs may increase the risk of bleeding problems if taken during treatment with warfarin. Carefully check all prescription/nonprescription product labels (including drugs applied to the skin such as pain-relieving creams) since they may contain NSAIDs or salicylates. Low-dose aspirin and related drugs (e.g., clopidogrel, ticlopidine) should be continued if prescribed by your doctor for specific medical reasons such as

## ExitCare® Patient Information

heart attack or stroke prevention. Ask your doctor or pharmacist about using these products safely. Many herbal medications have "blood-thinning" or "blood-clotting" effects, and some may directly affect warfarin. Tell your doctor before taking any herbal medications, especially bromelains, coenzyme Q10, cranberry, danshen, dong quai, fenugreek, garlic, ginkgo biloba, ginseng, goldenseal, St. Johns wort, among others. While taking warfarin, it is important to eat a balanced, consistent diet. Avoid sudden large increases or decreases in your intake of foods high in vitamin K (e.g., liver, broccoli, cauliflower, cabbage, Brussels sprouts, kale, spinach and other green leafy vegetables, green tea, certain vitamin supplements) because doing so may change the effect of this medication. This medication can affect the results of a certain lab test (theophylline level). Make sure laboratory personnel and all your doctors know you use this drug. This document does not contain all possible interactions. Therefore, before using this product, tell your doctor or pharmacist of all the products you use. Keep a list of all your medications with you, and share the list with your doctor and pharmacist.

**OVERDOSE:** If overdose is suspected, contact your local poison control center or emergency room immediately. US residents can call the US National Poison Hotline at 1-800-222-1222. Canada residents can call a provincial poison control center. Symptoms of overdose may include: bloody/black/tarry stools, pink/dark urine, unusual or prolonged bleeding.

**NOTES:** Do not share this medication with others. Laboratory and/or medical tests (e.g., blood tests such as PT/INR, complete blood count) should be performed periodically to monitor your progress or check for side effects. Consult your doctor for more details. It is important to eat a well-balanced diet while taking warfarin. If you are trying to lose weight, check with your doctor before you try to go on a diet.

**MISSED DOSE:** For the best possible benefit, do not miss any doses. If you do miss a dose, take it as soon as you remember if it is on the same day. If it is the next day, skip the missed dose and resume your usual dosing schedule. Do not double the dose to catch up because this could increase your risk for bleeding. Keep a record of missed doses to give to your doctor or pharmacist. Contact your doctor or pharmacist if you miss 2 or more doses in a row.

**STORAGE:** Store at room temperature between 59-86 degrees F (15-30 degrees C) away from light and moisture. Do not store in the bathroom. Keep all medicines away from children and pets. Properly discard this product when it is expired or no longer needed. Consult your pharmacist or local waste disposal company for more details about how to safely discard your product.

**MEDICAL ALERT:** Your condition and medication can cause complications in a medical emergency. For information about enrolling in MedicAlert, call 1-800-854-1166 (USA) or 1-800-668-1507 (Canada).

Information last revised August 2007 Copyright(c) 2007 First DataBank, Inc.

**NOTA IMPORTANTE:** Esto es un resumen y no contiene toda la información disponible de este producto. Para obtener la información completa de este producto o de las necesidades médicas específicas que usted tenga, consulte a su profesional del cuidado de la salud. Siempre busque la ayuda de su profesional del cuidado de la salud si tiene alguna pregunta acerca de este producto o de su afección médica. Esta información no constituye una opinión médica individual y no intenta sustituir el conocimiento y el criterio de su profesional del cuidado de la salud. Esta información no contiene ninguna garantía de que este producto resulte seguro, eficaz o apropiado para usted.

#### WARFARINA - ORAL

**ADVERTENCIA:** La warfarina puede causar sangrado intenso, potencialmente mortal, que puede ocurrir más fácilmente cuando se empieza el tratamiento con este medicamento y/o cuando la dosis es demasiado alta. El riesgo es mayor para los pacientes mayores de 65 años, los que tienen lesiones/cirugías importantes, antecedentes de sangrado estomacal/intestinal, o derrame cerebral. Su médico u otro profesional de la salud lo supervisará de cerca para reducir su riesgo. Asista a todas sus citas médicas/de laboratorio. (Consulte también la sección de Precauciones.) **USOS:** Este medicamento se usa para tratar y/o prevenir la formación de coágulos sanguíneos en su cuerpo. La prevención de coágulos sanguíneos ayuda a reducir el riesgo de derrame cerebral y de ataque cardíaco. Las afecciones que aumentan el riesgo de presentar coágulos sanguíneos incluyen cierto tipo de arritmia (fibrilación auricular), reemplazo de válvula cardíaca y ataque cardíaco reciente. La warfarina es un anticoagulante. Ayuda a mantener el flujo sanguíneo, disminuyendo los niveles de ciertas sustancias (proteínas de coagulación) en su sangre.

**MODO DE EMPLEO:** Lea la Guía de Medicamentos que su farmacéutico le facilita antes de tomar warfarina y cada vez que reciba una dosis adicional. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. Tome este medicamento por vía oral, con o sin alimentos, generalmente una vez al día, o de la manera indicada por su médico u otro profesional de la salud. Es muy importante tomar este medicamento exactamente de la manera recetada. No aumente la dosis, no lo tome con mayor frecuencia que la indicada ni deje de usarlo, a menos que su médico se lo indique. Para beneficiarse al máximo utilice este medicamento regularmente. Para recordar más fácilmente, úselo a la misma hora cada día. Algunos alimentos pueden alterar la forma en que la warfarina actúa en la sangre, afectando su tratamiento y dosis. El jugo de arándano y otros productos de arándano pueden afectar la acción de la warfarina. Hable con su médico o farmacéutico para obtener más detalles. (Vea también la sección de Interacciones con Otros Medicamentos para obtener información sobre otras interacciones con alimentos.) La dosificación dependerá de su afección médica y de su respuesta al tratamiento. Su médico u otro profesional de la salud lo supervisará de cerca mientras toma este medicamento. Por lo tanto, periódicamente se llevarán a cabo pruebas de laboratorio.

**EFFECTOS SECUNDARIOS:** Puede causar náuseas, falta de apetito, hinchazón estomacal/abdominal o retortijones. Informe inmediatamente a su médico o farmacéutico si cualquiera de estos efectos persiste o empeora. Recuerde que su médico le ha recetado este medicamento porque considera que el beneficio para usted es mayor que el riesgo de los efectos secundarios. Mucha gente que utiliza este medicamento no presenta efectos secundarios graves. Este medicamento puede provocar sangrado intenso si el efecto en las proteínas de coagulación es demasiado fuerte (con resultados anormalmente altos de TP e INR). Aunque su médico suspenda el uso de su medicamento, este riesgo puede durar hasta una semana. Informe inmediatamente a su médico si presenta algún signo de sangrado grave, incluyendo: dolor/inflamación/molestia inusual, dolor de cabeza intenso, mareos/desmayos, cansancio/debilidad inusual o persistente, heces con sangre/negras/alquitranadas, fácil o inusual aparición de moretones, sangrado prolongado de heridas o de las encías, sangrado nasal persistente/frecuente, flujo menstrual inusualmente abundante/prolongado, orina oscura/rosada, tos con sangre, vómito con sangre o con aspecto de café molido, latidos del corazón acelerados/fuertes, dolor en el pecho, falta de aliento, dificultad para tragar. En ocasiones muy poco frecuentes, este medicamento puede causar daños graves, potencialmente mortales, en la piel/tejidos. El riesgo para los pacientes que presentan ciertas afecciones sanguíneas (deficiencia de proteína C o S) puede ser mayor. Si no se trata este problema, este efecto puede causar daños graves a los tejidos (necrosis, gangrena) que requerirán cirugía o amputación. Busque atención médica de urgencia si presenta cualquiera de los siguientes efectos secundarios muy poco comunes pero graves: áreas de piel adoloridas/enrojecidas, decoloración oscura de cualquier parte del cuerpo (por ejemplo, de un dedo gordo del pie, seno, abdomen), dolor/sensibilización en los dedos de los pies, sensación de dolor/ardor intenso (por ejemplo, en senos, pierna, pie), úlcera en un pie, dolor en la espalda/costado/pecho, cambios en el volumen de orina, dolor en los músculos/articulaciones, cambios en la vista, confusión, trastorno del

habla, debilidad en un lado del cuerpo. Notifique inmediatamente a su médico si presenta cualquiera de los siguientes efectos secundarios muy poco probables pero muy graves: náuseas persistentes, vómitos, dolor estomacal/abdominal intenso, ojos/piel amarillentos. Es poco probable que se produzca una reacción alérgica muy grave a este medicamento. Sin embargo, busque atención médica de urgencia si presenta cualquiera de los siguientes síntomas de una reacción alérgica grave: erupciones de la piel, picazón, hinchazón, mareos intensos, dificultad para respirar. Esta no es una lista completa de los posibles efectos secundarios. Comuníquese con su médico o farmacéutico si nota otros efectos no mencionados anteriormente.

**PRECAUCIONES:** Consulte también la sección de Advertencia. Antes de tomar warfarina, informe a su médico o farmacéutico si es alérgico a ésta o si padece de cualquier otra alergia. No debe usar este medicamento si padece ciertas afecciones médicas. Antes de usarlo, consulte a su médico o farmacéutico en caso de: trastorno hemorrágico (por ejemplo, hemofilia), úlcera reciente/actual (por ejemplo, estomacal), ciertas enfermedades cardíacas (por ejemplo, pericarditis, derrame pericardíaco, endocarditis bacteriana), ciertas afecciones del cerebro (por ejemplo, hemorragia cerebrovascular, aneurisma cerebral), cirugía/procedimiento mayores, recientes o planeados (por ejemplo, cirugía de los ojos, bloqueo epidural lumbar), hipertensión grave no controlada (hipertensión maligna), ciertas complicaciones del embarazo (eclampsia, preeclampsia, riesgo de aborto). Antes de usar este medicamento, informe a su médico o farmacéutico acerca de su historial médico, especialmente acerca de: uso/abuso de alcohol, trastornos mentales/anímicos (incluyendo problemas de memoria), presión alta, enfermedad cardíaca (insuficiencia cardíaca), niveles altos de colesterol/triglicéridos, diabetes, enfermedad renal, enfermedad hepática, mala nutrición, enfermedad estomacal/intestinal (incluyendo problemas de absorción), deficiencia de vitamina C (escorbuto), hinchazón de brazos/piernas (edema), cáncer, tumor, radioterapia, problemas de tiroides, sondas en el cuerpo (por ejemplo, en la vejiga), daño a los tejidos (por ejemplo, gangrena, necrosis), lesiones o cirugías importantes recientes, trastornos hemorrágicos/de coagulación (por ejemplo, niveles bajos de vitamina K), trastornos de la sangre (por ejemplo, anemia, policitemia), enfermedad vascular (por ejemplo, arteriosclerosis, vasculitis), efecto secundario causado por el tratamiento con heparina (trombocitopenia inducida por heparina), miembros de la familia que no reaccionaron al tratamiento con warfarina. Este medicamento puede causar sangrado estomacal. El uso diario de alcohol mientras usa este medicamento aumentará su riesgo de sangrado estomacal. Limite o evite el consumo de bebidas alcohólicas. Evite las inyecciones en los músculos. Si tiene que recibir estas inyecciones, límitese a aplicarlas en los brazos, para que sea más fácil determinar si hay hemorragia y/o aplicar vendas de compresión. Comuníquese inmediatamente con su médico si padece enfermedades o infecciones que le causen fiebre, vómitos o diarrea por más de 2 días, ya que estas afecciones pueden alterar la forma en que la warfarina actúa. Es importante que todos sus médicos y dentistas sepan que usted está tomando warfarina. Antes de someterse a una cirugía o a cualquier procedimiento médico/dental, informe a su médico o dentista que está usando este medicamento. Este medicamento puede causar fuertes hemorragias. Para disminuir el riesgo de sangrado por cortadas, moretones o heridas, tenga especial cuidado con objetos afilados como rasuradoras o cortauñas. Para afeitarse utilice una rasuradora eléctrica, y para cepillarse los dientes, un cepillo de cerdas suaves. Evite actividades como los deportes de contacto. Si se cae o se hace daño, especialmente si se golpea en la cabeza, comuníquese inmediatamente con su médico. Es posible que sea necesario que su médico lo revise. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha indicado que ciertos productos genéricos de warfarina pueden intercambiarse entre sí. Sin embargo, consulte a su médico o farmacéutico antes de intercambiar productos de warfarina. Tenga cuidado de no tomar más de un medicamento que contenga warfarina, a menos que el médico o profesional de la salud que supervisa su tratamiento de warfarina se lo indique específicamente. Se recomienda precaución al administrar este medicamento a pacientes de edad avanzada, ya que pueden ser más sensibles a sus efectos. No se recomienda el uso de este medicamento durante el embarazo debido a la posibilidad de daño fetal (potencialmente mortal). Hable con su médico sobre métodos anticonceptivos confiables. Si queda embarazada o cree que puede estarlo, informe de inmediato a su médico. Si está planeando un embarazo, antes de quedar embarazada discuta con su médico un plan para controlar su afección. Es posible que durante el embarazo su médico cambie el tipo de medicamento que usa. Este medicamento no se excreta en la leche materna. Aunque no se ha reportado daño a lactantes, consulte a su médico antes de amamantar.

**INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:** Su médico o farmacéutico quizás ya tengan conocimiento de cualquier posible interacción con otros medicamentos y lo estén supervisando para detectarla. No empiece, suspenda ni cambie la dosificación de ningún medicamento, vitamina o producto herbal sin antes consultar con su

médico o farmacéutico. La warfarina interactúa con muchos productos de venta con y sin receta médica, vitaminas y productos herbales. Esto incluye medicamentos que se aplican a la piel o dentro de la vagina o el recto. Las interacciones siguientes no son una lista completa de las posibles interacciones medicamentosas. Las interacciones con warfarina generalmente resultan en un aumento o disminución del efecto anticoagulante. Los pacientes que toman warfarina deben recibir estricta supervisión médica, para prevenir problemas graves de sangrado o coagulación. No debe utilizar este medicamento junto con el siguiente medicamento porque puede producirse una interacción muy grave: mifepristona. Si actualmente está usando el medicamento antes mencionado, informe a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar warfarina. La aspirina y fármacos derivados de la aspirina (salicilatos) y otros fármacos Anti-Inflamatorios No Esteroides (AINE, como ibuprofeno, naproxeno, celecoxib) pueden tener efectos similares a los de la warfarina. Estos fármacos pueden aumentar el riesgo de padecer problemas hemorrágicos si se toman durante el tratamiento con warfarina. Revise cuidadosamente las etiquetas de todos sus medicamentos de venta con o sin receta médica (incluyendo medicamentos aplicados a la piel, tales como cremas analgésicas), ya que pueden contener fármacos AINE o salicilatos. Pero debe seguir el tratamiento con dosis bajas de aspirina y fármacos similares (clopidogrel, ticlopidina) si su médico lo recetó por razones médicas específicas, como la prevención de ataques cardíacos o derrames cerebrales. Consulte a su médico o farmacéutico sobre el uso prudente de estos productos. Muchos medicamentos herbales tienen efectos anticoagulantes o coagulantes, y algunos pueden afectar directamente la warfarina. Informe a su médico antes de tomar cualquier medicamento herbal, especialmente bromelina, coenzima Q10, arándano rojo, salvia, dong quai (angélica china), fenugreco, ajo, ginkgo biloba, ginseng, hidrastis, hierba de San Juan, entre otros. Mientras toma warfarina, es importante mantener una dieta balanceada y consistente. Evite aumentar o disminuir súbita y considerablemente el consumo de alimentos con alto contenido de vitamina K (por ejemplo, hígado, brócoli, coliflor, col, coles de Bruselas, col forrajera, espinaca y otros vegetales de hoja verde, té verde y ciertos suplementos vitamínicos), ya que pueden cambiar el efecto de este medicamento. Este medicamento puede afectar los resultados de ciertos análisis de laboratorio (niveles de teofilina). Asegure que el personal de laboratorio y todos sus médicos sepan que usted usa este medicamento. Este documento no menciona todas las posibles interacciones. Por lo tanto, antes de usar este producto, informe a su médico o farmacéutico de todos los productos que esté usando. Lleve siempre consigo una lista de todos sus medicamentos y compártala con su médico y su farmacéutico. **DOSIS EXCESIVA:** Si sospecha que ha usado una dosis excesiva, comuníquese de inmediato con su centro de control de intoxicaciones o la sala de emergencias. Los residentes de EE.UU. pueden llamar a la línea directa de EE.UU. para el control de intoxicaciones, al 1-800-222-1222. Los residentes de Canadá pueden llamar a un centro provincial para el control de intoxicaciones. Los síntomas de una dosis excesiva pueden incluir heces con sangre/negras/alquitranadas, orina rosada/oscura, sangrado inusual o prolongado. **NOTAS:** No comparta este medicamento con nadie. Periódicamente deben realizarse pruebas de laboratorio y/o médicas (por ejemplo, pruebas de sangre como PT/INR, hemograma completo) para supervisar su progreso o detectar efectos secundarios. Consulte a su médico para obtener más detalles. Es importante llevar una dieta balanceada mientras toma warfarina. Si está tratando de perder peso, consulte a su médico antes de empezar una dieta. **DOSIS OMITIDA:** Para beneficiarse al máximo no omita ninguna dosis. Si omite una dosis, tómela en cuanto se acuerde, si es el mismo día. Si se acuerda el día siguiente, no tome la dosis omitida y siga con su régimen de dosificación. No duplique la dosis para ponerse al día porque puede aumentar su riesgo de sangrado. Anote las dosis que omitió en una hoja para entregársela a su médico o farmacéutico. Comuníquese con su médico o farmacéutico si omite 2 o más dosis seguidas. **CONSERVACION:** Guarde a temperatura ambiente, entre 15 y 30 grados C (59 a 86 grados F), protegido de la luz y la humedad. No lo guarde en el cuarto de baño. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y las mascotas. Deseche apropiadamente este producto cuando se cumpla la fecha de caducidad o cuando ya no lo necesite. Consulte a su farmacéutico o a su compañía local de eliminación de desechos para obtener mayor información sobre cómo desechar de forma segura su medicamento. **ALERTA MEDICA:** Si se presenta una emergencia médica, su afección y medicamento podrían causarle complicaciones. Para obtener información sobre la suscripción a MedicAlert, llame al 1-800-854-1166 (EE.UU.) o al 1-800-668-1507 (Canadá).

Ultima actualización agosto, 2007 Copyright(c) 2007 First DataBank, Inc.